Haupt-Verzeichnis

über

Kakteen

von

Richard Graessner

Perleberg

(Provinz Brandenburg)

Der Preis des Verzeichnisses — — beträgt 0,50 RM. — —

Verkaufsbedingungen.

Versand gegen Nachnahme. Auftraggeber, welche Kredit verlangen, werden um Angabe von Referenzen gebeten. Bestellungen ohne Angabe der Zahlungsweise werden durch Nachnahme erledigt.

Die Preise sind in Mark und Pfennig, 1 Mk. = $^{10}/_{42}$ U.S.A.-Dollar, ausgedrückt und verstehen sich per Kasse.

Erfüllungsort für alle Zahlungen ist Perleberg.

Alle Zahlungen sind franko Perleberg zu richten und es ist unstatthaft, Porto- und Skonto-Abzüge zu machen.

Gerichtsstand für beide Teile ist das Amtsgericht in Perleberg.

Bei vorheriger Einsendung des Betrages wolle man ausreichende Deckung für Porto und Verpackung der Bestellung beifügen.

Die Verpackung wird mit der größten Sorgfalt mit Rücksicht auf die Jahreszeit ausgeführt, zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Alle Sendungen gehen auf Gefahr des Empfängers.


Adresse bitte auch bei jeder sich wiederholenden Bestellung recht deutlich anzugeben.

Reklamationen müssen sofort nach Empfang der Sendung angebracht werden.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Offerten ihre Gültigkeit.

Die **Samenliste** erscheint im Januar jeden Jahres und wird auf Wunsch zugesandt.

Postscheck-Konto: Berlin Nr. 9287.
Bank-Konto:
Perleberger Creditbank, Städt. Sparkasse, Perleberg.
Telegramm-Adresse: Kakteenzüchter Perleberg.
Fernruf 353.



Cereus-Gruppe aus meinem Garten

Kakteen.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann.

Die Preise verstehen sich zur Größe und Seltenheit.

Ariocarpus Scheidw.

fissuratus K. Sch. . .	4 b. 20
Kotchubeyanus K. Sch.	3 b. 6
Lloydii Rose . . .	6
retusus Schdw. . . .	7 b. 10
trigonus K. Sch. . .	3 b. 20

Cephalocereus Pfeiff.


macrocephalus Web.	10 b. 30
senilis Pfeiff. (Greisenhaupt)	3 b. 100

Cereus Mill.

acutangulus Otto . .	2
ambiguus P. DC. . .	2,50
amecaensis Heese . .	2,50
angulosus Stieb. . .	1,50
Anisitsii K. Sch. . .	1,50 b. 5
areolatus Mhlpf. . .	1,50
aurivillus K. Sch. . .	3
azureus Parm. . . .	2,50
Baumannii Lem. . .	1,50 b. 10

Baumannii f. cristata 15
„ var.
flavispinus K. Sch. 1,50 b. 8
bavosus Web. . . . 3 b. 10
baxaniensis Karw. . 3
Boeckmannii Otto . 2
bolivianus Web. . . 3
Bonplandii Parm. . . 2
Bridgesii S.-D. . . . 2 b. 10
candicans Gill. . . . 2,50 b. 10

euphorbioides Haw. 2,50 b. 10
flagelliformis Mill. . 3 b. 5
Forbesii Otto . . . 4 b. 15
formosus S.-D. . . 3
„ f. mon-
struosa. . . . 3 b. 10
Funkii K. Sch. . . . 2,50 b. 20
geometrizans Mart. . 2 b. 5
giganteus Eng. . . . 5 b. 50
gladiatus Lem. . . 4 b. 10




Agaven-Gruppe aus meinem Garten

Cavendishii Monv. . 2,50 b. 8
chalybaeus Otto . . 3 b. 20
Childii 2
chilensis Colla . . 4 b. 20
coerulescens S.-D. . 2 b. 5
„ var.
melanacanthus K.
Sch. . . . . . 3 b. 8
coryne Otto . . . 3 b. 15
Damazioi K. Sch. . . 2,50
Davisii De L. . . . 2,50
del Moralii Purp. . 4 b. 20
Donkelaeri S.-D. . . 3
Dumortieri S.-D. . . 3
eburneus S.-D. . . 2,50 b. 20
euchlorus Web. . 2,50 b. 10

grandiflorus Mill. . . 2
(Königin der Nacht.)
„ var. armillatus . 2,50
„ „ barbadensis
Weing. 2,50
„ „ cubensis . 2,50
„ „ Maximilianus 2,50
„ „ Uranus Hort. 2,50
„ „ Tellii . . . 3
Greggii Eng. . . . 5
Guelichii Speg. . . . 2 b. 20
haematuricus Web. . 4
hamatus Scheidw. . 2 b. 5
Hankeanus Web. . . 2 b. 10
Hassleri K. Sch. . . 2 b. 10

Hirschtianus K. Sch. .	1,50	
huascha var.		
flaviflorus Web. .	4	
inermis Otto . . .	1,50	
irradians Lem. . . .	2,50	
isogonus K. Sch. . .	3	

Linkii Hort.	6	
longispinus S.-D.		
f. monstruosa . .	5	
Mac Donaldiae Hook	1	b. 50
macrogonus S.-D. .	1	b. 3
Mallisonii Hort . . .	3	



Meine Gruppe auf der Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung Dresden 1926

jamacaru P. DC. .	1	b. 3
„ var. caracore .	2	b. 15
„ „ cyaneus Cels.	3	
Jusbertii Reb. . . .	3	b. 20
Kunthianus Otto . .	2,50	
laetevirens S.-D. . .	2	b. 4
lamprochlorus Lem. .	2	b. 10
lamprospermus K. Sch.	2,50	

mamillatus Eng. . .	4	
marginatus P. DC. .	3	b. 25
marmoratus Zeiss. .	3	b. 4
Martinii Lab. . . .	2	b. 10
nigripilis Phil. . . .	2,50	
nycticalus Lk. . . .	2	
Ocamponis S.-D. . .	2,50	
paraguayensis H. j. .	2,50	b. 15


pasacana Hort. . .	8	
perlucens K. Sch. .	2	b. 15
peruvianus Mill. . .	1	b. 10
„ var. hexagonus	2	b. 10
„ f. monstruosa P. DC.	5	b. 20
pitahaya f. monstruosa	5	
polychaetus Rchb. .	1,50	b. 10
rhodoleucanthus K. Sch. . . .	2	b. 5
rigidus Lem. . . .	2	
Roezlii Hge. jun. . .	2,50	b. 10
Scheeri S.-D. . . .	4	
Schenckii Purp. . .	2,50	
Schrankii Zucc. . .	1	b. 5
Seidelii Lehm. . . .	3	



Echinocactus Grusonii-Gruppe meiner Ausstellung im „Clou" Berlin 1927

pomanensis Web. .	2	
Pondurii	2,50	
Pringlei Wats. . .	2,50	
pterogonus Lem. . .	5	
Regellii Nick. . . .	2	b. 10
repandus Haw. . .	1	b. 3
Rettigii	10	b. 20
Senkii	2,50	
serpentinus P. DC. .	1	b. 3
„ var. albispinus .	2	
Silvestrii Speg. . . .	3	b. 10
„ f. cristata . . .	3	b. 10
sonorensis Rge. . .	1,50	
Spachianus Lem. . .	1	b. 3

speciosus K. Sch. . . .	1,50	b. 20
Spegazzinii Web. . . .	4	b. 10
spinulosus P. DC. . . .	2,50	
stellatus Pfeiff . . .	4	b. 6
Strausii Vaup. . . .	4	b. 30
„ f. cristata . .	30	
streptocaulon	3	
triangularis var. Uhdeanus S.-D.	2,50	
trigonus Haw. . . .	1,50	
validus Haw . . .	2,50	
viperinus Web. . . .	5	
xanthocarpus K. Sch.	2	b. 5



Cephalocereus senilis-Gruppe (Greisenhaupt) meiner Ausstellung im „Clou" Berlin 1927.

strigosus Gill . . .	2	b. 10
tephracanthus Lab. .	3	b. 20
tetragonus Haw. . .	2	b. 5
thelogonus Web. . .	3	b. 20
tortuosus Forb. . . .	2	b. 10
Treleasii Vpl. . . .	4	
triangularis Haw. . .	2	

Coryphantha Lem.

Palmeri	1

Echinocactus Lk. et Otto.

acutissimus Otto et Dietr.	4
„ f. cristata . .	8
anfractuosus Mart. .	2

apricus Arech. . . . 2,50
asterias Zucc. Sämling 3
„ Original . . . 5 b. 50
Arechavaletai K. Sch. 10
arizonicus K. . . . 2
Beguinii Web. . . . 3 b. 10

capricornus var. senilis
Fr. 10
castaneoides Cels. . 5
cataphractus Dams . 10
centeterius Lem. . . 3 b. 20
chilensis Hildm. . . . 5




Echinocactus Wislizeni-Gruppe meiner Ausstellung im „Clou" Berlin 1927

bicolor Gal. . . . . 3—5
„ var. bolansis
K. Sch. . . . 6 b. 10
„ var. tricolor
K. Sch. . . . . 6 b. 10
capricornus Dietr. . 2, 8 b. 20
„ var. major . . 10 b. 20
„ „ minor Rge.
et Q. . . 8 b. 15

cinerascens S.-D. . . 6
cinerius R. A. Phil. . 5—10
columnaris Pfeiff. . . 15
concinnus Monv. . . 2,50 b. 4
„ f. cristata . 8
coptonogonus Lem. . 10
Coquimbanus Grus. cat. 6

corniger P. DC. . . . 1, 3 b. 25
„ var. flavispinus
Hge j. 5 b. 12
corynodes Otto . . 2,50
crispatus P. DC. . . 3 b. 6
Cumingii Hopff. . . 3 b. 10
cupreatus Pos. . . . 10
cylindraceus Eng. . . 3 b. 20
Damsii K. Sch. . . . 2 b. 20
denudatus Lk. et Otto 3
„ var. Heuschkehlii
Hge. jr. . . 5 b. 15
„ „ paraguayensis
Hge. jr. . . 4 b. 20

gibbosus var. caespitosus
Fr. . . . . . 3 b. 20
„ var. Fennellii
Hge. j. 3
„ var. leucacanthus
K. Sch. 2,50
„ „ leucacanthus
f. cristata 10
„ „ multicostatus 5 b. 15
„ „ Schlumbergeri
K. Sch. 3
Graessneri K. Sch. . 10 b. 30
Grahlianus Hge. j. . 2 b. 10
grandicornis Lem. . 3 b. 6



Ariocarpus fissuratus




Cephalocereus senilis

dichroacanthus Mart. . 6
Droegeanus Hildm. . 4
echidna P. DC. . . 2,50
ebenacanthus Monv. . 5
Ehrenbergii Pfeiff. . . 8
electracanthus Lem. . 3 b. 200
erinaceus Lem. . . . 4
Fiebrigii G. . . . . 4 b. 6
Fiedlerianus K. Sch. . 4
flavicomus Arech. . . 5
flavovirens Scheidw. . 4 b. 10
Fricii Arech. 5
Gasseri Böd. 2,50
gibbosus P. DC. . . 2 b. 10
„ f. cristata . . . 10

grandis Rose . . . 4 b. 100
Grossei K. Sch. . . 5 b. 30
„ f. cristata . . . 15
Grusonii Hildm. . 1, 10 b. 200
Gürkeanus Heese . . 6
haematacanthus Monv. 4 b. 30
Haselbergii Hge. j. . . 2,50
heterochromus Web. . 6
hexaëdrophorus Lem. 1, 3 b. 6
horizonthalonius Lem. 3 b. 5
„ var. centrispinus R. Mey.
m. gekr. fein. rosa
Stacheln . . . . 3 b. 5
horripilus Lem. . . 4 b. 10
Horseus . . . . . 5 b. 10

hyptiacanthus Lem. .	4, 6	
ingens Zucc.	4	b. 30
„ var. saltillensis K. Sch. . . .	4	b. 15
intertextus Eng. . . .	5	b. 15
Johnsonii Parry . .	10	b. 20
Joossensianus Böd. .	20	
Jussieui Monv. . . .	2,50	
lafaldensis Vpl. . . .	3	b. 5
lancifer Dietr. . .	1, 4	b. 8
Leninghausii K. Sch. .	4	b. 10
leucacanthus Zucc. .	3	b. 6
Lewinii Henn. . . .	4	b. 10
Lloydii Rose	4	b. 10
longihamatus Gal. .	1, 3	b. 20

Mihanovichii Fr. et Gürke	1	
minusculus Web. . .	1,50	b. 3
„ f. cristata . . .	8	
Monvillei Lem. . . .	1	b. 10
Mostii Gürke . . .	5	b. 12
multicostatus Hildm. .	3	b. 6
multiflorus Hook . .	4	
„ var. albispinus K. Sch.	6	
„ „ parisiensis K. Sch.	5	
muricatus Otto . . .	5	
myriostigma S.-D. .	2,50	b. 20
„ vierkantig . .	4	b. 20




Echinocactus Beguinii

lophothele S.-D. . .	6	
Maassii Heese . . .	5	b. 15
Mac Dowellii Qu. et Reb.	3	b. 20
Malletianus Lem. . .	5	
mammulosus Lem. .	2	b. 5
Mathssonii Berge . .	3	b. 10
microspermus Web. .	3	b. 15
„ var. macrancistrus K. Sch.	3	b. 10
„ „ „ f. cristata	15	


napinus R. A. Phil. .	8	
Netrelianus Monv. . .	5	
nidulans Qu.	6	b. 20
ornatus Dietr. . . .	5	b. 20
„ var. glabrescens Web.	8	b. 20
Ottonis Lk. et Otto	1, 3	b. 6
„ var. brasiliensis Hge. jr.	4	b. 8
„ „ paraguayensis Hge. jr.	4	b. 10




Echinocactus capricornus



Echinocactus cinerascens



Echinocactus electracanthus




Echinocactus corniger

Ottonis var. tenuispinus K. Sch. 4
„ „ tortuosus K. Sch. 3 b. 20
Ourselianus Monv. . 3 b. 10
Pepinianus Lem. . . 6
peruvianus K. Sch. . 5 b. 10
Pfeifferi Zucc. . . . 3 b. 20
phymatothelos Pos. . 4 b. 10
pilosus Gal. . . . 6 b. 20
platensis Speg. . . . 3
pumilus Lem. . . . 1,50
„ var. gracillimus Web. 2,50
Quehlii Hge. j. . . . 2 b. 10
rafaëlensis Purpus . 5 b. 20
recurvus Lk. et Otto Säml. 1
„ Originale . . 3 b. 25
reductus var. flavispinus 2,50
Reichei K. Sch. . . . 4
rinconadensis Pos. . 6 b. 10
robustus Karw. . . 5 b. 10
Saglionis Cels. . . . 3 b. 10
Saussieri Web. . . . 4 b. 10
Scheeri S.-D. 10
Schickendantzii Web. 5 b. 10
Schilinzkyanus Hge. j. 2 b. 10
Schmiedeckerianus . 6
Schumannianus Nic. . 8
scopa Lk. et Otto . . 5
„ f. cristata . . 10
Sellowii Lk. et Otto . 2
„ var. Martinii K. Sch. 2
Sellowii var. tetracanthus S.-D. 4 b. 15
setispinus Eng. . . . 1 b. 25
Simpsonii Eng. . . . 5
streptocaulon Hook. . 4 b. 10
submammulosus Lem. 3 b. 10
Sutterianus Schick. . 6 b. 15
tabularis Cels. . . 2,50 b. 5
tenuiflorus Lk. . . . 3
tetraxiphus Otto . . 2,50
texensis Hopff. . . . 4 b. 25
tulensis Pos. . . . 8
turbiniformis Pfeiff. . 3 b. 5
uncinatus var. Wrightii Eng. 6 b. 20
unguispinus Eng. . . 10
Vanderaeyi Lem. . . 1,50
villosus Lem. . . . 12
violaciflorus Qu. . . 4 b. 6
Williamsii Lem. . . 4 b. 30
Wippermannii Mhlpf. . 5
Wislizeni Eng. 1,50, 10 b. 200
zacatecasensis Rose . 2,50 b. 6


Echinocereus Eng.

acifer Lem. 3
„ var. longispinus 5 b. 10
„ „ trichacanthus K. Sch. 6
Berlandieri Lem. . . 2
Blankii Palm. . . . 2,50
boliviensis Pos. . . . 3
Brandegeei K. Sch. . 5
carnosus Rümpl. var. major 3
chloranthus Rümpl. . 3 b. 6
cinerascens Lem. . . 2,50
cirrhifer Lab. . . . 2,50



Echinocactus flavovirens


concinnus	5	
conglomeratus Först. .	4	b. 25
dasyacanthus Eng. .	3	b. 6
„ f. cristata	10	
De Laetii G. . . .	3	b. 6
dubius Rümpl. . . .	2,50	
Ehrenbergii Eng. . .	2	
„ f. cristata	6	
Engelmannii Lem. . .	6	b. 20
enneacanthus Eng. .	2,50	
„ f. cristata . .	5	
„ var. robustus	4	
Fendleri Rümpl. . .	3	b. 5
leptacanthus K. Sch. .	1	b. 3
maritimus K. Sch. . .	3	
mojavensis Rümpl. .	4	
papillosus A. Lk. . .	5	b. 10
paucispinus Rümpl. .	5	b. 8
pectinatus Eng. . . .	3	b. 10
„ f. cristata .	20	
„ var. adustus K. Sch.	3	
„ var. adustus f. cristata	5	b. 100
„ var. caespitosus K. Sch.	1	b. 20



Echinocactus Graessneri


flaviflorus Coult. . .	2,50	
Galtieri Reb.	4	
glycimorphus Först. .	2,50	
Hempelii K. Sch. . .	10	
Knippelianus Liebn. .	4	b. 8
Kunzei Först. . . .	8	
leonensis Mathss. . .	2,50	
pectinatus var. rigidissimus Eng.	3	b. 25
„ „ rufispinus K. Sch.	10	
pencilis Brand. . . .	3	
pentalophus Lem. . .	2,50	
phoeniceus Lem. . .	3	

polyacanthus Eng. .	4	b. 6
„ var. albispinus Hort.	5	
Poselgerianus A. Lke.	3	b. 10
procumbens Lem. . .	2	b. 4
pulchellus K. Sch. . .	5	
rubescens Dams . .	4	
Salm Dyckianus Scheer	2,50	
saltillensis	5	
Scheeri Lem. . . .	2,50	
calochlora K. Sch. . .	5	
„ var. multiflora R. Mey.	3	
campylacantha R. Mey.	8	b. 20
catamarcensis Web. .	8	
cinnabarina Lab. . .	2,50	b. 5
„ var. Chereauniana Cels.	2,50	
„ var. Chereauniana f. cristata	20	b. 30




Echinocactus grandis

spinibarbis S.-D. . .	3	b. 5
stramineus Rümpl. . .	2,50	
tuberculatus	2,50	
tuberosus Rümpl. . .	3	b. 6
Uspenskii Hge. jr. . .	8	
viridiflorus Eng. . .	2,50	b. 10
Weinbergii Weing. . .	10	b. 20
Echinopsis Zucc.		
albispinosa K. Sch. .	5	
apiculata Lke. . . .	2	b. 5
aurea Rose	6	b. 20
Bridgesii S.-D. . . .	4	
Decaisneana Lem. . .	1	b. 3
Droegeana Berge . .	1	b. 3
Eyriesii Zucc. . . .	1	b. 4
„ var. fl. roseo	1	b. 3
„ „ inermis	1	b. 4
Fiebrigii Gürke . . .	5	
Fischeri	1	b. 3
formosissima Lab. . .	5	
gemmata K. Sch. syn. turbinata Zucc.	1	b. 3
gigantea R. Mey. . .	6	b. 20
Graessneriana Hge. jr.	1	b. 3



Echinocactus Grusonii


guatemalensis Emsk.	3	b. 10
Huottii Lab.	3	
imbricata	1	b. 3
Lagemannii Dietr. . .	1	b. 3
leucantha Walp. syn. salpingophora Lem.	2	b. 10
Mieckleyi Heese . .	10	
Misleyi Lab. syn. obrepanda K. Sch.	3	
multiplex Zucc. . . .	1	b. 3
„ f. cristata .	10	
Mülleri Hort. . . .	1	b. 3
nigerrima Hort. . .	1	b. 3
obrepanda K. Sch. syn. Misleyi Lab.	3	
oxygona Zucc. . . .	2	b. 3
„ × Eyriesii . .	1	b. 3
paraguayensis . .	1	b. 3
Pentlandii S.-D. . .	2,50	
„ var. Cavendishii Hildm.	3	
„ „ Colmarii Neub.	2,50,	5
„ „ ferox Hort.	4	
„ „ longispina Rümpl.	2,50	
„ „ Pfersdorffii Hort.	2,50	
„ „ vitellina Hildm.	4	b. 10
Pudantii Hort. . . .	1	
Quehlii Hildm. . . .	2	b. 3
Rettigii var. aurea .	5	
rhodacantha S.-D. . .	10	
rhodotricha K. Sch. .	2	
„ var. argentiniensis R. Mey.	1	b. 5
„ „ robusta R. Mey.	2	b. 10
Rohlandii Hort. . .	1	b. 10
„ f. cristata .	10	
„ × Eyriesii .	1	b. 3
„ var. speciosa Hort.	1	b. 3
Rotheriana	1	b. 5
Salmiana Web. . . .	2,50	b. 8
salpingophora Lem. syn. leucantha Walp.	3	b. 10
salpingophora var. aurea Hort.	8	
Schelhasei Pfeiff. . .	1	b. 3
Schickendantzii Web.	1,50	b. 5
spiniflora	5	b. 12
triumphans Jak. . .	1	b. 3
„ var. fl. pleno Hort.	1	b. 3
tubiflora Zucc. syn. Zuccarinii Pfeiff. .	1	b. 3



Echinocactus Maassii

turbinata Zucc. syn.		
gemmata K. Sch.	1	b. 3
„ var. fl. roseo .	1	b. 3
valida var. Forbesii R.		
Mey.	3	b. 10
Wilkensii Hort.	1	b. 4
Zuccarinii Pfeiff. syn.		
tubiflora Zucc.	1	b. 3
„ f. cristata . .	15	
„ var. fl. roseo	1	b. 3
„ var. robusta .	1	b. 3

Mr. Belle, Fleischfarbe
Mr. Chatenay, Lachsfarbe
Mons. E. Andrée, violett, fast blau
Meteor, karmin
Mons. Fournier, karmin
Président Grévy, karmin
roseum amabile, weinrot
salmoneum, blutrot
„ var. flavum, feurig, ziegelrot
spectabile var. carmineum, karmin
superbum, violett



Echinocactus horizonthalonius

Epiphyllum Salm.


Altensteinii, karminrot
Deutsche Kaiserin, karminrot mit weißen Herzen
Dr. Slaveki
E. Madlain, lachsfarbig
Harrisonii, feurig ziegelrot
Le Vesuv, violett
Mad. Alfasse, violett
Mad. E. Andrée, karmin
Mad. Fournier, violett
magnificum
violaceum, violett
„ var. album
„ „ grandiflorum, violett
„ „ superbum, violett
Veredelung 2,50 b. 10

Leuchtenbergia Hook. et Fisch.


principis Hook. et Fisch 3 b. 20

Lepismium Pfeiff.


anceps Web. . . .	1,50
commune Pfeiff. . .	1,50
Knightii Pfeiff. . .	1,50




Echinocactus Mathssonii




Echinocactus Mihanovichii



Echinocactus Monvillei




Echinocactus microspermus
v. macrancistrus



Echinocactus Mac Dowellii

Mamillaria Haw.


acanthoplegma Lem. . 4
amoena Hopff. . . . 4
angularis Lk. et Otto . 3 b. 10
„ var. longiseta S.-D. 3 b. 20
„ „ rufispina 5
asterias Cels. . . . 1, 5 b. 12
Baumii Böd. . . . 2,50 b. 5
bicolor Lehm. . . . 3 b. 20
„ f. cristata . . 10
„ var. nivea K. Sch. 3 b. 15
candida Schdw. . . 2,50 b. 8
caput Medusae Otto . 4 b. 10
carnea Zucc. . . . 1, 3 b. 50
Celsiana Lem. . . . 3 b. 10
centricirrha Lem. . 1 b. 3
„ f. cristata . . 6
„ var. Krameri K. Sch. 2
„ „ macracantha K. Sch. 2,50
„ „ recurva K. Sch. 3 b. 12
„ „ Senckii 3




Echinocactus myriostigma

bocasana Pos. . . . 2,50
„ f. cristata . 10
bombycina Quehl . 4
calochlora 5
camptotricha D. . . 3
centricirrha var. Webbiana 2,50
ceratites Qu. . . . 4 b. 6
chionocephala Purp. . 6 b. 20
clava Pfeiff. . . . 2 b. 5
collina Purp. . . . 1, 4 b. 20

Echinocactus ornatus




Echinocactus platensis



Echinocactus recurvus

conimamma Hildm.	3	b. 10
conoidea P. DC. . .	2,50	b. 10
conspicua Purp. . .	4	b. 6
„ var. nigrispina	3	b. 6
cornifera P. DC. . .	2,50	b. 10
cornuta Hildm. . .	3	b. 6
crucigera Mart. . .	4	b. 8
daemonoceras Lem.		
var. jaumavei	1,50	
decipiens Scheidw. .	2,50	
dolichocentra Lem. .	4	
Donatii Bge.	3	b. 8
Donkelaeri	2,50	

erecta Lem. . . .	3	b. 20
eriacantha Lk. et O.	3	b. 5
erythrosperma Böd. .	1,50	b. 10
eximia Ehrbg. . . .	3	
fertilis Hildm. . . .	3	
flava Eng.	4	
formosa Scheidw. .	5	
„ f. cristata . .	12	
fulvolanata Hort. . .	2,50	
fuscata Otto var.		
esperanza	1, 3	b. 10
gigantea Hildm. . .	20	
gladiata Mart. . . .	2	b. 3




Echinocactus rafaelensis

durangensis Rge. . .	5	
Dyckiana Zucc. . .	4	b. 6
elegans P. DC. . .	1, 2,50	b. 10
elephantidens Lem. .	4	b. 10
elongata P. DC. . .	1	
„ var. echinata		
K. Sch.	1,50	
„ „ rufocrocea		
K. Sch.	2,50	
„ „ stella aurata		
K. Sch.	1	b. 10
„ „ tenuis		
K. Sch.	1	
Emundtiana Rümpl. .	2,50	

gladiaspina Böd. . .	5	b. 10
glochidiata Mart. . .	1,50	
gracilis Pfeiff. . . .	0,50	
„ var. pulchella		
S.-D.	0,50	
„ „ robustior		
Hort.	1	
grandiflora Otto . .	4	b. 10
Grahamii Eng. . . .	1	b. 10
Halei Brand. . . .	10	
Heeseana M. Dow.	1, 4	b. 10
Heyderi var. applanata Eng.	1, 3	b. 10
hidalgensis Purp. .	3	b. 6


Karwinskyana Mart. .	3	b. 15
kewensis S.-D. . .	4	b. 12
Lapaixii	4	b. 6
lasiacantha		
var. denudata Eng.	2,50	
lenta Brand.	4	
leona Pos.	2,50	b. 4
Liebneriana K. Sch. .	5	
longimamma P. DC. .	2,50	
„ f. cristata . .	10	
„ var. lactea . .	2	
„ var. melanoleuca Karw.	3	
macromeris Eng. . .	2,50	b. 15
macrothele Mart. . .	3	
mazatlanensis K. Sch.	1	
meiacantha Eng. . .	1, 4	b. 6
micromeris Eng. . .	2,50	b. 5
pentacantha Pfeiff. .	2	b. 3
Perringii Hildm. . .	5	
phymatothele Berg. .	3	
plumosa Web. . . .	2	b. 5
Poselgeriana Hge. jr.	5	
Praelii Mühlpfd. . .	2,50	
procera Ehrbg. f. cristata	10	
pseudoechinata Böd. .	8	
pseudofuscata Quehl.	3	b. 6
pseudopolyedra . . .	2,50	
pusilla P. DC. . . .	1	
„ var. haitiensis K. Sch.	1,50	
„ „ multiceps S.-D.	1	
„ „ texana Eng.	1	
radians P. DC. . . .	1, 3	b. 6
radicantissima Qu. .	4	b. 6



Echinocactus texensis

missouriensis Sw. . .	1,50	
Mölleriana Böd. . . .	6	b. 10
multihamata Böd. . .	2,50	
Mundtii K. Sch. . . .	5	
mutabilis Schdw. . .	3	b. 50
„ var. autumnalis Dietr.	1, 4	b. 20
napina Purp. . . .	10	
Nickelsiae Kath. Brand.	3	b. 6
Nuttallii Eng. . . .	4	b. 10
Odieriana Lem. . . .	10	
Ottonis Pfeiff. . . .	10	
Palmeri Jac. . . .	5	
Parkinsonii Ehrbg.	1, 4	b. 250
Parmentieri Otto . .	3	
pectinata Eng. . . .	4	
radiosa Eng	0,75	
„ var. neo-mexicana Eng.	0,75	
rhodantha Lk. et O. .	3	b. 50
„ f. cristata . .	15	
„ var. callaena K. Sch.	4	
„ var. chrysacantha K. Sch.	4	
„ var. crassispina K. Sch.	1,4	b. 12
„ var. Pfeifferi K. Sch.	3	b. 12
„ var. pyramidalis K. Sch.	4	

rhodantha var. sulphurea K. Sch.	3	b. 40
„ var. sulphurea f. cristata	15	
Roseana Brand. . . .	3	
Salm-Dyckiana Scheer	5	
Sartorii Purp. . . .	1, 3	b. 10
Scheeri Mühlenpf. . .	15	
Schelhasei Pfeiff. . .	2,50	
Schulziana	3	
Schwartzii (Haagea)	3	b. 5
scolymoides Schdw. .	5	b. 10
tenampensis Br. et Rose	1, 3	b. 10
Thornberi Orc. . . .	2,50	
trichacanta K. Sch. . .	3	
„ f. cristata . .	6	
Trohartii Hildm. . .	3	b. 8
umbrina Ehrbg. . .	4	b. 6
uncinata Zucc. . . .	3	b. 8
vetula Mart.	1,50	
Viereckii	4	b. 10
viperina Purp. . . .	2,50	b. 10
Wildii Dietr.	1,50	b. 5
„ f. cristata . .	5	b. 10



Echinocereus pectinatus v. caespitosus

Seideliana Qu. . . .	4	
senilis Lodd.	6	
sphacelata Mart. . . .	2	
sphaerica Dietr. . . .	2,50	
spinosissima Lem. . .	3	b. 10
„ var. sanguinea Hge. jr.	3	b. 12
strobiliformis Mhlpf. .	3	b. 10
„ var. pubescens Quehl.	3	
subpolyedra S.-D. . .	2,50	
supertexta Mart. . .	2	b. 15
Wissmannii Hildm. .	2,50	b. 8
zephyranthoides Scheidw.	5	

Nopalea S.-D.


Auberi S.-D.	2	
coccinellifera S.-D. .	2	
dejecta S.-D.	1,50	
guatemalensis Rose .	1,50	

Obregonia.

Denegrii Fr.	5	b. 15


Opuntia Mill.

Name	Price	
andicola Pfeiff. . . .	2,50	b. 5
arborescens Eng. . .	0,75	b. 2
aristata	0,75	
basilaris var. nana. Hge. jr.	1	
Beckeriana K. Sch. .	0,75, 1,50	
Bigelowii Eng. . . .	3	b. 5
Camuessa Web. . . .	0,75	
cereiformis Web. . .	5	
clavarioides Lk. et O.	3	b. 5
„ f. cristata .	3	b. 5
ficus indica Mill. . .	1	b. 3
„ var. Amyclaea Ten.	0,75	
„ „ frutescens Eng.	0,75	b. 2
filipendula Eng. . .	1	
flavicans Lem. . . .	1	
floccosa S.-D.	3	
foliosa S.-D.	0,75	
formidabilis Juor . .	3	b. 5
Geissei R. A. Phil. . .	1	
glaucescens S.-D. . .	1	



Echinocereus viridiflorus

Name	Price	
Cordoni	1	b. 2
cylindrica P. DC. . .	0,75	b. 2
„ f. cristata .	3	b. 10
dejecta S.-D.	1,50	
diademata Lem. . . .	2,50	b. 5
Dillenii P. DC. . . .	2	
elata Lk. et Otto . .	1	
elongata Haw. . . .	1	b. 3
Engelmannii S.-D. .	1,50	
glomerata Haw. . .	1,50	
grata Phil.	1	b. 5
haematocarpa Berger	0,75	
halophylla	3	b. 5
Hevernikii	1	
hyptiacantha Web. .	2	
imbricata P. DC. . .	0,75	b. 2
inermis P. DC. . . .	0,75	
intermedia S.-D. . .	1	




Echinopsis cinnabarina v. Chereauniana

Kunzei Rose	2	
Labouretiana Hort. .	1,50	
leonina Hge. et Schm.	1	
leptocaulis P. DC. . .	0,75	
leucotricha P. DC. . .	0,75	
linguiformis Griff. .	3	
lurida Eng.	1	
macrorrhiza Eng. . .	0,75	
macrophylla Hort. .	1	
maculacantha Först. .	0,75	b. 3
maxima Hort. . . .	0,75	b. 5
megacantha S.-D. .	0,75	b. 2
„ var. lasiacantha Hort.	1	
microdasys Lem. . .	0,75	
„ f. monstruosa	3	b. 8
„ var. rufida K. Sch.	0,75	
microdisca Web. .	0,75	
Mieckleyi K. Sch. . .	0,75	b. 2
Miquelii Monv. . . .	3	
monacantha Haw. .	0,75	b. 3
nigricans Haw. . . .	1,50	
occidentalis Eng. et Big.	1	b. 3
paraguayensis K. Sch.	0,75	b. 3
platyacantha S.-D. .	2	
polyacantha Haw. .	0,75	
puberula Pf. . . .	0,75	
Rauppiana K. Sch. .	3	b. 6
robusta Wendl. . .	1	
Scheeri Web. . . .	1	
Spegazzinii Web. . .	0,75	
spirocentra Eng. et Big.	0,75	
stapeliae P. DC. . .	1,50	
stricta Haw. . . .	0,75	b. 2
subulata Eng. . . .	2	b. 4
texana Pfeiff. . . .	1	
tomentosa S.-D. . .	0,75	b. 3
Treleasii Coult. . .	2	b. 10
„ f. cristata .	5	
tuna Mill.	0,75	b. 5
tunicata Lk. et Otto .	0,75	b. 5
ursina Web. . . .	5	
Verschaffeltii Cels. .	1	
Winteriana Berger .	0,75	

Opuntia winterharte

Die winterharten Opuntien verlangen einen durchlässigen Boden und gedeihen in jeder Erde; in unseren oft schneelosen Wintern schütze man die Pflanzen durch Auflegen von Tannenzweigen vor Sonnenstrahlen.

albispina rhod. salmonea
„ xanth. rubra
arborescens Eng.
camanchica Eng.
„ var. albispina L. Sp.
„ „ longispina L. Sp.




Echinopsis Fiebrigii


camanchica var. major Hrt.
" " minor Hrt.
" " pallida L. Sp.
" " rubra L. Sp.
fragilis var. caespitosa L. Sp.
missouriensis salmonea L. Sp.
pachyarthra flava L. Sp.
pachyclada rosea L. Sp.
Rafinesquei Eng. et Big.
" var. cymochila K. Sch.
rhodantha K. Sch.
" var. brevispina L. Sp.
" " pisciformis L. Sp.
rupicaprea H. et S.
vulgaris Mill.
xanthostemma K. Sch.
" var. elegans L. Sp.
" var. fulgens L. Sp.
" var. gracilis L. Sp.
jede Sorte 1 b. 3

Peireskia Linn.

aculeata Plum. 1
Godseffiana Hort. . . 1



Echinopsis Salmiana




Echinopsis salpingophora

Pelecyphora Ehrbg.

aselliformis Ehrbg. .	3	b. 8
pectinata K. Sch. . .	2	b. 5
" f. cristata . .	20	

Phyllocactus Lk. und **Hybriden.**

Ackermannii S.-D.
Adolphi, rot, innen lila
Ahocardo, ziegelrot
alatus, Deutsche Kaiserin, rosa, sehr reichblühend
Aida, rosa
Alta Luz, hellorange
Augusti, postrot
Aurore nankin salmon, lachsrot
Barrientos, hell kupfer in violett
Beauté de Passy, sehr groß rosa
Bismarck, violett kupferrot
Carmaron, dunkelrosa
Caparti, weiß
Carmen, dunkelrot
Castneri, gelbweiß
Chico, orange
caulorrhizus Lem.
Cooperi, gelb
crenatus Vogelii
Delicias, amarantrot
Desdemona, pfirsichrot
Dewet, leuchtendrot in violett
Edmundi, dunkelrosa
Elsalto, zinnoberrot
Erica, leuchtend dunkelzinnober



Mamillaria angularis v. longiseta


Erleri, rosacarmin
Ernesti, rot
Esperanza, ziegelrot
Fr. v. Schiller
Gordonianus, leuchtend lachsrot
grandiflorus, rot
Hidalgo, lachsrot
Hitchensis, dunkeljohannisbeerrot
Jalappa, lachsrot
Jenkinsonii superbus
Jessy de Comink, rosa
John Senecio, johannisbeerrot
Keithii, lachsrot
kermesinus magnus
Lauchii, ziegelrot
Martha, dunkellachsrot
Mayanus, scharlach
Miss Hanna, rosa
Neubertii
Pfersdorffii, Sepalen gelb, Mitte weiß
Santa Rosalio, zart lachsfarben
Sao Paulo, goldorange
Schoenfeldi, orange
specillimus, hellorange
Tettaui, dklviolett, purpur Rückseite
Tumbala, lachsrot
Ulbrichtii, violettrosa
van der Maelen
Zamora, blaurosa
junge Pflanzen 1,50

Pilocereus Lem.

barbatus Reb. . . . 6
Celsianus Lem. . . 20
„ var. Bruennowii K. Sch. 5
„ „ gracilior K. Sch. 12
chrysacanthus Web. 10
„ f. cristata 25
Consolei Lem . . 5 b. 15
erythrocephalus K. Sch. 5
exerens K. Sch. . . 6 b. 15
flavispinus Rümpl. . 6
fulviceps Web. . . 10
fulvispinus Haw. . . 5
Hoppenstedtii Web. 3 b. 20
Houlletii Lem. . . 5 b. 10
jubatus S.-D. . . . 5
lanuginosus Rümpl. . 6 b. 10
Palmeri 10
Royenii Rümpl. . . 8
Sartorii Rose . . . 3
Schottii Lem. . . . 3 b. 10
scoparius Pos. . . 5 b. 10
strictus Rümpl. . . 4
„ f. cristata . . 20
tetetzo Web. . . . 10

Pterocactus K. Sch.

Kuntzei K. Sch. . . 2 b. 3




Mamillaria camptotricha

Rhipsalis Gärtn.

bambusoides Loefgr.
cassytha Gärtn.
cavernosa Lindb.
dissimilis K. Sch.
floccosa S.-D.
gibberula Web.
grandiflora Haw (= funalis S.-D.)
Houlletiana Lem. (= Regnellii Lindb.)
paradoxa S.-D.
penduliflora N. E. Br.
pilocarpa Loefgr.
prismatica Rümpl. (= Suareziana Web.)
pulvinigera Lindb.
rhombea Pf.
salicornioides Haw.
squamulosa K. Sch.
Swartziana Gris.
teres Steudel (= conferta S.-D.)
Tonduzzii Web.
trigona Pf.
Warmingiana K. Sch.

jede Sorte 1,50



Mamillaria cornifera

Kakteen

für angehende Liebhaber in nur guten Arten

12 Sorten	6
25 Sorten	15
50 Sorten	40

starke, blühbare Pflanzen

12 Sorten	30
25 Sorten	75
50 Sorten	160 b. 400
100 Sorten	300 b. 1000

Sukkulente Pflanzen

Adromischus


clavatus	1,50	
v. d. Heidenii	2	

Agave

americana	2	b. 10
„ var. fol. var.	2	b. 20
applanata	3	
atrovirens	3	b. 10
caespitosa	1	
candelabrum	3	
chloracantha	3	b. 10
densiflora	5	b. 25
filifera	10	
Franzosinii	2	b. 10
Goeppertiana	10	
lophantha	1	b. 5
macrantha	5	b. 25
micracantha	2	b. 3
mitis	10	
picta	2	
polyacantha	3	b. 8
Pringlei	5	
rupicola	15	
Salmiana	5	
victoriae reginae	10	

Aloë


arborescens	1	b. 20
Beguinii	3	b. 20
caesia	1	
eru	1	
„ var. maculata	1	
ferox	1	
fulgens	1	
Greenii	1	
Hanburyana	1	b. 5
latifolia	1	
longiaristata	3	b. 5
marmorata	1	
Paxii	1	
percrassa	1	
runcinata	1	
saponaria	3	
Schimperi	1	
spinosa	2,50	
striata	1	
supralaevis	1	
„ var. erythrocarpa	1	
umbellata	1	
variegata	4	b. 8
virens	1	
Winteri	1	




Mamillaria candida

Anacampseros


filamentosa	1
omburensis	3
rufescens	2,50
telephiastrum	2



Mamillaria carnea



Mamillaria Celsiana



Mamillaria kewensis

Bryophyllum

crenatum 1

Bulbine

caulescens 3

Caralluma

europaea 2,50
Lugardii 2,50
Nebrownii 4

Ceropegia


dichotoma 3
radicans 2,50
stapeliiformis . . . 7,50
Woodii 3

Cotyledon


ametystina 3
Barbeyi 2
cristata 3
gracilis 1,50
longifolia 3
tricuspidata 2,50

Crassula

arborea . . . . . . 2 b. 10
arborescens 2
Bolusii 1,50
coccinea 1
Cooperi 1,50
cordata . . . . . . 2 b. 3



Mamillaria elegans



Mamillaria hidalgensis

cultrata 1
elata 1,50
Justus Corderoy . . 2
lactea . . . . . . 1 b. 5
lycopodioides . . . 1,50
marginalis . . . 1
orbicularis 1,50
perfossa 2
portulacea . . . . 1 b. 10
praealta 2
pseudolycopodioides . 2
punctata 0,75
rosularis . . . . 2 b. 3
rotundifolia 2
rubicunda 1,50
Schmidtii . . . . 0,50 b. 3
spathulata 1,50
tetragona 1,50

Cyanotis


kewensis 1,50

Dasylirion


acrotrichum . . . 1,50
glaucophyllum . . . 3

Duvalia


hirtella 2,50




Mamillaria fuscata esperanza




Mamillaria mutabilis



Mamillaria macromeris



Mamillaria Heeseana



Mamillaria longimamma

polita	2,50	
reclinata	2	

Dyckia

longifolia	3	
rariflora	3	

Echeveria


agavoides	2	b. 10
„ f. cristata . .	4	
amoena	1	
arizonica	1	b. 3
Bergeriana	2	b. 3
bracteosa	1,50	b. 10
„ f. cristata .	3	
chrysantha	1,50	
coccinea	2	b. 5
Derenbergii . . .	3	b. 5
Desmetiana . . .	1	b. 3
elegans	2	b. 5
farinosa	2	b. 4
lanceolata	3	b. 10
lancifolia	1,50	
leucotricha	4	
linguifolia	3	b. 5
„ var. pulverulenta	3	b. 5
metallica	1	b. 3
„ var. glauca . .	3	
mucronata	1,50	b. 4
perbella	3	b. 6
pilosa	3	b. 6
Pringlei	1,50	
pruinosa	1,50	b. 3
pubescens	1	b. 3
pulchella	1,50	b. 4
pulvinata	1,50	b. 4
pusilla	1	
retusa	2	
rosacea var. glauca .	2	
rubella	2	b. 10
scaphophylla . . .	3	b. 10
Scheideckeri . . .	1	b. 3
secunda	1	
„ var. glauca .	1	b. 4
„ „ „ f. cristata	3	
setosa	2	
subalpina	1,50	b. 10
Weinbergiana . . .	3	

Echidnopsis


Dammanniana . . .	3	

Euphorbia

alcicornis	2	b. 20
anacantha	2	
Bojeri	2	b. 5
bubalina	4	
canariensis	2	
caput Medusae . .	2	b. 30
cereiformis	2	
Cooperi	1,50	
dendroides	0,75	
globosa	1,50	b. 10
grandidens . . .	2	b. 20
lactea	1,50	
Ledienii	2	
mamillaris	1	
meloformis	5	




Mamillaria Parkinsonii



Mamillaria collina

Mamillaria sphacelata



Mamillaria radians

natalensis	5	
neriifolia	2	
ornithopus	1,50	
piscatoria	1	
pugionifer	2	
resinifera	2	
Schimperi	1,50	
splendens	2	b. 10
triangularis	3	
virosa	2	

Fourcroya

Bedinghausii	3	b. 5
elegans	3	b. 5
Lindenii	5	
pubescens	3	b. 5

Gasteria

cheilophylla	1,50
disticha	1,50
maculata	1,50
minima	2
mollis	1
scaberrima	2
spiralis	2
subverrucosa	2
verrucosa	2

Greenovia

aurea	3	b. 10

Haworthia

attenuata	2,50
cymbiformis	2
coarctata	2,50
margaritifera	5
radula	2
tesselata	3
turgida	2
virescens	2,50

Heurnia

Penzigii	3
Schneideriana	5

Kachanchoe


Ena	2,50	
glaucescens	2	
grandiflora	2	
kewensis	3	b. 10
marmorata	2,50	
rotundifolia	2,50	
Schimperi	1,50	
Schumanniana	2	

Kleinia


amaniensis	1,50
antheuphorbium	2
articulata	1,50
canescens	2
cylindrica	1
ficoides	2
Grantii	2
odora	1,50
radicans	1,50
repens	1
vestita	3

Mesembrianthemum


acinaciforme L.	1
agninum Haw.	4
albinotum Haw.	1



Mamillaria Heyderi v. applanata




Mamillaria radiosa v. neo-mexicana



Mamillaria viperina

aloides Haw. . . . 1,50
alpinum Dtr. (Lithops) 12 b. 20
aureum L. 1
Axthelmianum Dtr. . 2
barbatum L. . . . 1
bifidum Haw. . . . 2,50
blandum Haw. . . 1
Bolusii Hook. . . . 3
Brownii Hook. . . . 1
calamiforme L. . . 3
calcareum Marl. . . 3 b. 4
cannium Haw. . . 3
Caroli Schmidtii Dtr.
et Brgr. 3
Cooperi Hook. . . 1
congestum Salm . . 1
cordifolium L. . . 1,50
cultratum Salm . . 1
deltoides Mill. . . . 1


Lehmannii Eckl.
et Zeyh. 1,50
leifidum 1
Lesliei N. E. Br.
(Lithops) 3
linguiforme L. . . . 1,50
lunatum Willd. . . . 1
lupinum Haw. . . . 2,50
Margaretae Schw.
(Dinteranthus) . . 12 b. 20
maximum Haw. . . 1,30
Meyeri (Cheiridopsis) 2
mickbergensis Dtr. sp. n.
(Lithops) 15
microspermum Schw.
(Dinteranthus) . . 12
multiceps Salm . . . 2,50
multipunctatum Salm . 2
murinum Haw. . . 1




Mamillaria rhodantha v. Pfeifferi

densum Haw. . . . 1,50
diversifolium Haw. . 2
Eberlanzii Dtr. et
Schw. (Lithops) 12
ebracteatum . . . 1
echinatum Ait. . . 1,50
edule L. 1,50
elegans Jacq. . . . 1,50
Ecklonis Salm . . . 1,50
falciforme Haw. . . 1
fulgidum 1
heteropetalum Haw. 1
Hoerleinianum . . . 2
inclaudens Haw. . . 1
lacerum Haw. . . . 1


noctiflorum L. . . . 1,50
Pageae N. E. Br. (Conophytum) pro Kopf 3,
von drei Köpfen ab
perfoliatum Mill. . . 1,50
pseudotruncatellum
N. E. Br. (Lithops) . 4 b. 6
Puttkamerianum Dtr.
Brgr. 1,50
rhomboideum Salm . 1,50
roseum Willd. . . 1
rugosum Dtr. sp. n.
(Lithops) . . 12
Ruschiorum Dtr. et Schw.
(Lithops) . . . 12 b. 20




Mamillaria Wildii f. cristata



Mamillaria valida



Mamillaria Wissmannii



Pelecyphora pectinata

scabrum L. var. roseum 1,50
scapigerum Haw. . . *2*
Schwantesii Dtr. sp. n.
(Lithops) 10
semidentatum Haw. . 1
spectabile Haw. . . 1
splendens L. . . . 1
stellatum Mill. . . . 1,50
summitatum Dtr. (Lith.) 15
Taylorii N. E. Br. . 3
tigrinum Haw. . . . *2* b. 5
tumidulum Haw. . . 1
umbelliflorum Jacq. . 1
vallis Mariae Dtr.
et Schw. (Lithops) . 15
vespertinum Brgr. . . *2*
vulvaria Dtr. . . . 1,50
Weigangianum Dtr. . *2*

Monanthes

argyrostaphis . . . 1,50
brachycaulon . . . 1,50
hybrida 1,50
laxiflora 2,50
muralis *2*

Oliveranthus

elegans . . . . *2* b. 3

Pachyphytum

bracteosum . . . 1,50 b. 10
„ f. cristata . . . 3
brevifolium . . . 3
Hookeri 2,50
uniflorum 3

Pachyveria

glauca 4

Petrophyes

polyphillum , . . 1,50

Rochea

falcata 2,50
longifolia 3,50
perfoliata 2,50

Sedrastrum


ebracteatum . . . 2,50

Sedum für Kalthaus

carneum 1
„ var. fol. var. . . 1
dendroideum . . 1 b. 10
„ f. cristata . *2*
Eichlamii 2,50
farinosum *2*
humifusum . . . 1
multiceps 1
Nußbaumii . . . *2*
Palmeri 1
pachyphyllum . . *2*
retusum 1
Sieboldii 1,50
„ var. fol. var. 1,50
Stahlii 1
thelephiastrum . . 1
villosum 1


Sedum für Freiland

acre



Pilocereus chrysacanthus

Aizoon
Albertii
album
altissimum
anacampseros
atrosanguineum
Borderi
Braunii
calabricum
collinum
cruentum
Maximoviczii
maximum
Middendorfianum
ochroleucum
olympicum
oreganum
populifolium
pruinatum
rupestre
sexangulare
spurium var. splendens



Pilocereus Hoppenstedtii

cyaneum
dasyphyllum
Ewersii
„ var. turkestanicum
Fabaria
glaucum
hybridum
kamtschaticum
„ var. fol. var.
Laggeri
Lehmannii
Lydium
telephium
„ var. purpurascens
jede Sorte 0,75


Sempervivum für Kalthaus

arboreum 1,50
„ var. fol. var. . . 2,50
„ atropurpureum . 1,50
caespitosum . . . 1,50
chrysanthum . . . 1,50
decorum 1
Goochiae 2
Haworthii 1

leucoblepharon . . 1
pygmaeum . . . 1,50
radicescens . . . 1,50
„ var. fol. var. 1,50
tabulaeforme . . . 1,50 b. 5
villosum 1,50

Sempervivum für Freiland

acuminatum
affine
albidum
alpinum
anomalum
Funkii
globiferum
grandiflorum
Hausmannii
heterotrichum
hirtum
hispidulum
Laggeri
Lehmannii
Mettenianum
Moggridgei
Neilreichii



Heurnia Penzigii

arachnoideum
arenarium
arvernense
atropurpureum
Boissieri
Boutignyanum
calcareum
californicum
Comolii
Doellianum
elegans
fimbriatum
flagelliforme
parviflorum
piliferum
robustum
rupestre
rupicolum
Scherzerianum
Schlehanii
Schnittspahnii
soboliferum
tectorum
„ var. pyrenaicum
tomentosum
triste

Wulfenii	
jede Sorte	0,75

Senecio

crassipes	1,50
longifolius	1,50
tropaelifolius . .	1,50

Stapelia

anguinea	1,50
angulosa	1,50
bella	2,50
charybdis	1,50
deflexa var. lurida . .	1,50
discolor	1,50
europaea	1,50
geminata	1,50
hispida	1,50
marmorata	1,50
mermilis	1,50
Munbyana	1,50
muricata	1,50
mutabilis	1,50
Nopenackyi . . .	1,50
normalis	1,50
sororia	2,50
trifida	1,50
unguipetala . . .	1,50
Uspenskii	1,50
variegata var. marmorata	1,50

Umbilicus


spinosus	2	

Urbinia

Purpusii	3	b. 5

Yucca

aloifolia	3	b. 10
„ variegata .	3	b. 10
filamentosa . . .	2,50	



Haworthia Margaritifera

Für Sukkulenten-Liebhaber äußerst wertvoll:
Sukkulentenforschungen in Südwestafrika. Von Professor Dinter. I. Teil: Preis Mk. 5,—. II. Teil. Soeben erschienen. Preis Mk. 4,50. Der erste Teil bringt in interessanter Art den Bericht mit den Ergebnissen der Forschungsreise Prof. Dinters im Jahre 1922 und der zweite Teil die Erlebnisse und Ergebnisse in Südwestafrika vom Jahre 1923 bis 1925.

Kakteen-Erde

gesiebt, in vorzüglicher Beschaffenheit

5 kg	1,20
25 kg	4,00
50 kg	6,00
100 kg	10,00

Purpusol


best bewährtes Vertilgungsmittel für alle Kakteenschädlinge

1 Flasche 2 RM.

Zimmer-Gewächshäuser


Reizender Zimmerschmuck. Erfolgreiche Blumenzucht. Schutz gegen Luftzug und Temperaturwechsel. Dauerhaft weiß lackiert, rot abgesetzt. Mit Stufenbänken zum Daraufsetzen der Töpfe.

Es lassen sich in solchen niedlichen Gewächshäuschen mit schönstem Erfolge Tulpen, Hyazinthen, Maiblumen, **Kakteen** und dergleichen treiben und ebenso können infolge der feuchten Luft, die in einem solchen Gewächshaus durch Hineinlegen eines feuchten Schwammes oder durch Einstellen eines mit Wasser gefüllten Gefäßes zu erzielen ist, mit Vorteil alle Pflanzen kultiviert werden.



Nr. 1—5

Nr.	cm hoch	cm lang	cm breit	M.
Nr. 1.	12 cm hoch,	11 cm lang,	9 cm breit,	M. 3,20
„ 2.	16 „ „	18 „ „	11 „ „	„ 5,10
„ 3.	20 „ „	25 „ „	15 „ „	„ 9,00
„ 4.	25 „ „	30 „ „	18 „ „	„ 10,50
„ 5.	30 „ „	42 „ „	22 „ „	„ 13,80
„ 5a.	37 „ „	50 „ „	27 „ „	„ 19,00
„ 6.	13 „ „	14 „ „	9 „ „	„ 4,20
„ 7.	18 „ „	18 „ „	12 „ „	„ 6,90
„ 7a.	24 „ „	26 „ „	16 „ „	„ 12,00
„ 8.	30 „ „	25 „ „	20 „ „	„ 13,50
„ 9.	36 „ „	40 „ „	25 „ „	„ 18,00
„ 10.	42 „ „	50 „ „	30 „ „	„ 24,60



Nr. 6—10

Druck:
Martin Böcker, Graphische Kunstanstalt,
Wittenberge.